



## Można użyć dwóch różnych szczepionek

**Złe samopoczucie po pierwszej dawce? Poradź się lekarza. Teraz drugą dawkę szczepienia możesz dostać preparatem innej firmy**

**Artykuł archiwalny. [Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat szczepień przeciw COVID-19](#)**

Drugie szczepienie może zostać przeprowadzone dawką innego preparatu niż pierwsze:

- jeśli ktoś miał po pierwszej dawce szczepienia Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP) określonym preparatem, ale korzyści z zapobieżenia ciężkiej postaci COVID-19 z uwagi na bycie w grupie ryzyka są większe
- jeśli podano mu pierwszą dawkę innej szczepionki niż rekomendowana dla jego grupy wiekowej.

W przypadku wystąpienia powikłań po podaniu pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, podanie drugiej dawki szczepionki innego rodzaju (po szczepionce wektorowej szczepionki mRNA, po mRNA szczepionki wektorowej) należy przeprowadzić z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni.

Decyzję podejmuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że wystąpienie Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego (NOP) powinno zostać odnotowane zgodnie z procedurami, a informacja na temat NOP powinna zostać udokumentowana (również w karcie szczepienia) w czasie wizyty lekarskiej, w trakcie której odbywa się kwalifikacja do szczepienia.

**[Sprawdź, jaką szczepionkę dostaniesz w przypadku dawki przypominającej](#)**