pacjent.gov.pl

Przypominające – wcześniej dla osób po J&J

Data aktualizacji
2023-12-04

Każda osoba 18+ może zaszczepić się dawką przypominającą:

- e-skierowanie na szczepienie przypominające dostaniesz po 3 miesiącach, jeśli szczepiłeś/aś się Moderną, Pfizerem lub AstrąZeneką
- jeśli szczepiłeś się preparatem Johnson&Johnson, e-skierowanie na szczepienie przypominające dostaniesz teraz po 2 miesiącach.

Od 25 stycznia **dawką przypominającą mogą się zaszczepić nastolatki w wieku 16-18 lat**.

Od 28 stycznia e-skierowanie na szczepienie przypominające dostają **nastolatki w wieku 12-15 lat**.

Twoje e-skierowanie znajdziesz na **Internetowym Koncie Pacjenta** lub w aplikacji **mojeIKP**, z której

łatwo przejdziesz do e-rejestracji na szczepienie.

Zasady łączenia szczepionek przy szczepieniu przypominającym

Ministerstwo Zdrowia zaleca, by podać:

- po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA lub AstraZeneca – szczepionkę mRNA (Pfizer, Moderna) po 3 miesiącach
- po szczepieniu szczepionką Johnson&Johnson – szczepionkę mRNA lub tę samą szczepionkę J&J

Lekarz może w indywidualnych, wyjątkowych wypadkach zalecić podanie szczepionki Johnson&Johnson po szczepieniu podstawowym szczepionką mRNA (po co najmniej 5 miesiącach).

> **Od 16 września osoby, które zgłoszą się na pierwsze szczepienie przypominające, również mogą otrzymać preparat przeciw wariantom Omikron BA.1 lub BA.4/5, jeśli będzie on dostępny w tym punkcie szczepień.**

Zasady łączenia szczepionek przy szczepieniu podstawowym

Ministerstwo Zdrowia rekomenduje przy szczepieniu podstawowym, żeby pierwsza i druga dawka szczepionki była tej samej firmy.

W sytuacji konieczności zmiany szczepionki jest możliwość zastosowania schematu mieszanego. MZ

rekomenduje, by po szczepionce wektorowej (AstraZeneca) podać szczepionkę mRNA (Pfizer, Moderna). Tylko w wyjątkowych sytuacjach preparaty mogą być podane w odwrotnej kolejności. Należy zachować co najmniej 28 dni odstępu przed podaniem drugiej dawki.