



Cztery dawki dla chorych przewlekle

Jeśli jesteś osobą chorą przewlekle, która przyjęła dawkę dodatkową, masz możliwość przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 po 5 miesiącach od dawki dodatkowej

Do osób chorych przewlekle, z niską odpornością, które mogą ciężiej przechodzić COVID-19, zalicza się osoby:

- w trakcie leczenia przeciwnowotworowego
- po przeszczepach narządów, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne
- po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat
- z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge'a, zespół Wiskotta-Aldricha)
- zakażone wirusem HIV
- leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną
- dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Po 3 miesiącach od przyjęcia dawki dodatkowej osoby chore przewlekle otrzymają e-skierowanie na dawkę przypominającą, która dla nich będzie czwartą dawką szczepionki.

Uwaga, jeśli od przyjęcia dawki dodatkowej minęło co najmniej 160 dni, nie dostaniesz automatycznie e-skierowania na dawkę przypominającą. Skontaktuj się z Twoim lekarzem, żeby ocenił twój stan zdrowia i wystawił Ci skierowanie.

Umówić się na szczepienie można:

- poprzez aplikację [Dowiedz się jak ściągnąć aplikację](#) przez aplikację mojejKP: [mojejKP na telefon](#)
- dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989 w godz. 7.00-20.00
- kontaktując się z wybranym punktem szczepień [Znajdź punkt szczepień](#)
- poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl (w przypadku osób dorosłych).

Przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz badania przesiewowego. Można to zrobić [online](#) lub ściągnąć ze strony, wypełnić i przynieść ze sobą. Jeśli zapomnisz o kwestionariuszu, dostaniesz go w punkcie szczepień.

Osobom po dawce dodatkowej, jako szczepienie przypominające, zaleca się szczepionkę mRNA Pfizer-BioNTech lub Moderna. Lekarz może w indywidualnych, wyjątkowych wypadkach zalecić podanie osobie dorosłej szczepionki Johnson&Johnson.

Od 16 września osoby, które zgłoszą się na pierwsze szczepienie przypominające, również mogą otrzymać preparat przeciw wariantom Omikron BA.1 lub BA.4/5, jeśli będzie on dostępny w tym punkcie szczepień.

Po przyjęciu dawki przypominającej dostaniesz Unijną Certyfikat COVID, który będzie ważny bezterminowo.

Nie tylko choroby przewlekłe, ale również wiek, płeć i masa ciała mają wpływ na to, jak Twój organizm może zareagować na zakażenie koronawirusem.

[Sprawdź, jak możesz przechodzić COVID-19, jeśli się nie zaszczepisz](#)

Druga dawka przypominająca

Jeśli masz powyżej 18 lat i obniżoną odporność, otrzymałeś/aś pierwszą dawkę przypominającą, to od 22 lipca 2022 automatycznie dostałeś/aś skierowanie na drugą dawkę przypominającą. Jeśli jednak nie dostaniesz e-skierowania (z uwagi na złożone i szczególne terapie), zgłoś się do lekarza prowadzącego lub lekarza POZ (np. konsultacja telefoniczna, e-wizyta lub wizyta w poradni) z prośbą o jego wystawienie.

W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 12–17 lat po e-skierowanie na szczepienie należało zgłosić się do lekarza.

Od 16 września 2022 r. możesz zaszczepić się drugą dawką przypominającą przeciw COVID-19, jeśli masz 12 lat i więcej. E-skierowanie na szczepienie drugą dawką przypominającą znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojejKP.

Szczepienie drugą dawką przypominającą będzie wykonywane preparatami przeciw wariantom Omikron BA.1 lub BA.4/5. W blisko 90 proc. przypadków chronią one przed ciężkim przebiegiem choroby COVID-19 lub hospitalizacją.

Obniżona odporność

Jesteś osobą z obniżoną odpornością, gdy:

- otrzymujesz aktywne leczenie przeciwnowotworowe
- po przeszczepach narządowych przyjmujesz leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne
- jesteś po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat
- masz umiarkowany lub ciężki zespół pierwotnych niedoborów odporności
- jesteś zakażony wirusem HIV
- leczysz się aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną
- jesteś dializowany przewlekle z powodu niewydolności nerek.