



## 60+: Zaszczep się czwartą dawką

Masz skończone 60 lat? Od 22 lipca 2022 r. możesz zaszczepić się drugą dawką przypominającą przeciwko COVID-19. Drugie szczepienie przypominające mogą też przyjąć osoby w wieku 12+ o obniżonej odporności

 [Artykuł archiwalny. Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat szczepień przeciw COVID-19](#)

## Dla osób 60-79 lat

Od 22 lipca możesz zaszczepić się drugą dawką przypominającą, jeśli masz 60-79 lat, jesteś po pełnym szczepieniu podstawowym i pierwszej dawce przypominającej. Od 16 września na szczepienie możesz umówić się po 90 dniach od pierwszej dawki przypominającej.

Już wcześniej możliwość zaszczepienia się drugą dawką przypominającą miały osoby w wieku 80.

Od 16 września szczepienie drugą dawką przypominającą jest wykonywane preparatami przeciw wariantom Omikron BA.1 lub BA.4/5.

E-skierowanie na szczepienie drugą dawką przypominającą znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP.

[Dowiedz się więcej o aplikacji mojeIKP](#)

Na szczepienie możesz się umówić:

- przez [e-rejestrację](#) dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl
- [Dowiedz się jak ściągnąć aplikację](#) przez aplikację mojeIKP: [mojeIKP na telefon](#)
- przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989 w godz. 7.00-20.00
- w wybranym punkcie szczepień [Znajdź punkt szczepień](#).

Dawka przypominająca podniesie Twoją odporność na koronawirusa.

## Dla osób 12+ z obniżoną odpornością

Jeśli masz powyżej 18 lat i obniżoną odporność, otrzymałeś/aś pierwszą dawkę przypominającą, to automatycznie dostaniesz skierowanie na drugą dawkę przypominającą. Jeśli jednak nie dostaniesz e-skierowania (z uwagi na złożone i szczególne terapie), zgłoś się do lekarza prowadzącego lub lekarza POZ (np. konsultacja telefoniczna, e-wizyta lub wizyta w poradni) z prośbą o jego wystawienie.

W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat po e-skierowanie na szczepienie należy zgłosić się do lekarza.

Jesteś osobą z obniżoną odpornością, gdy:

- otrzymujesz aktywne leczenie przeciwnowotworowe
- po przeszczepach narządowych przyjmujesz leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne
- jesteś po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat
- masz umiarkowany lub ciężki zespół pierwotnych niedoborów odporności
- jesteś zakażony wirusem HIV
- leczysz się aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną
- jesteś dializowany przewlekle z powodu niewydolności nerek.

[wszystkie osoby 12+ mogą przyjąć drugą dawkę](#)

Od 16 września [przypominającą](#).

[Szczepienie 4. dawką dla medyków](#)

