Bąblowica – letnie zagrożenie

Data aktualizacji
2024-05-27

Bąblowica jest chorobą, która przenosi się ze zwierząt na ludzi, a powodują ją larwy tasiemca bąblowcowego. Ludzie zarażają się latem, np. jedząc niemyte jagody zbierane w lesie.

Do organizmu człowieka larwy tasiemca mogą dostać się poprzez:

- bliski kontakt ze zwierzętami
- przeniesienie jaj tasiemca do ust za pomocą brudnych rąk
- spożycie skażonej jajami tasiemca żywności lub wody.

Przebieg choroby

Choroba rozwija się latami i dlatego jest trudna do zdiagnozowania. Jej objawem jest cysta (torbiel) zawierająca larwy. Kiedy cysta rośnie, naciska na narządy i powoduje bóle oraz zmiany przypominające nowotwór. Nieleczona, może nawet prowadzić do śmieci. Chirurgiczne usunięcie cysty z otaczającą tkanką zapewnia całkowite wyleczenie. Ważne jednak, żeby cysta została usunięta, zanim pęknie i pasożyty się nie rozprzestrzenią.

Cysty można wykryć podczas USG jamy brzusznej, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej czy zwykłego prześwietlenia.

Objawy bąblowicy

Objawy ściśle związane są z lokalizacją cysty, które umiejscawiają się najczęściej w:

- wątrobie
- płucach
- nerkach
- śledzionie
- ośrodkowym układzie nerwowym
- kościach.

Chory odczuwa bóle, ucisk na narządy. Cysty w wątrobie mogą dać objawy żółtaczki, w płucach – powodować duszności i krwioplucie, w nerkach – krwiomocz, w mózgu – bóle głowy i zaburzenia psychoneurologiczne.

Zapobieganie zarażeniu

Żeby nie zachorować, należy:

- zachowywać zasady higieny podczas i po pracy w polu, ogrodzie, lesie
- pamiętać o myciu rąk po kontakcie ze zwierzętami
- dokładnie myć przed jedzeniem lub poddawać obróbce termicznej owoce leśne i grzyby

- chronić posesję przed lisami (częstymi nosicielami jaj tasiemca) poprzez ogradzanie domostw i zabezpieczanie śmietników, które przyciągają dzikie zwierzęta
- regularnie odrobaczać zwierzęta domowe preparatami działającymi na tasiemce.