pacjent.gov.pl

Szczepienia przeciw COVID-19 nadal bezpłatne

Data aktualizacji
2026-09-25

Dostępna jest najnowsza szczepionka Spikevax XFG. Szczepionka dla dzieci poniżej 12 lat będzie dostępna od 29 września.

Jak się umówić na szczepienie

Szczepienia przeciw COVID-19 są wykonywane bez e-skierowania. Zapisujesz się w punkcie szczepień, czyli przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub w aptece. Przejdź do

mapy aptek, w których możesz się zaszczepić

> **Nie ma już potrzeby wypełniania kwestionariusza oceny zdrowia przed szczepieniem.**

Informację o swoim szczepieniu znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta lub mojeIKP.

Kto może się zaszczepić

Zaszczepić mogą się wszyscy ubezpieczeni w NFZ.

Kto	Szczepionka	Schemat podania	Miejsce szczepienia
Osoby 12+ bez obniżonej odporności	Spikevax XFG w dawce 50 mikrogramów	Dawka jednorazowa	Pełnoletni: przychodnie POZ i punkty szczepień w aptekach (mających umowę z NFZ na szczepienia) Niepełnoletni: przychodnie POZ
Osoby w wieku 12+ z ciężkim niedoborem odporności	Spikevax LP.8.1 w dawce 50 mikrogramów	Kolejna dawka po 2 miesiącach. O szczepieniu decyduje lekarz	Pełnoletni: przychodnie POZ i punkty szczepień w aptekach (mających umowę z NFZ na szczepienia) Niepełnoletni: przychodnie POZ
Dzieci 5-11 lat	Spikevax XFG w dawce pediatrycznej 25 mikrogramów	Dawka jednorazowa	Przychodnie POZ
Dzieci 6 miesięcy-4 lata nieszczepione przeciw COVID-19	Spikevax XFG w dawce pediatrycznej 25 mikrogramów	Dwie dawki po 0,25 ml w odstępie co najmniej 28 dni	Przychodnie POZ
Dzieci 6 miesięcy-4 lata szczepione przeciw COVID-19	Spikevax XFG w dawce pediatrycznej 25 mikrogramów	Dawka jednorazowa	Przychodnie POZ
Dzieci 6 miesięcy-4 lata nieszczepione przeciw COVID-19 z ciężkim niedoborem odporności	Spikevax XFG w dawce pediatrycznej 25 mikrogramów	Trzecią dawkę można podać po upływie co najmniej 28 dni od drugiej dawki. O szczepieniu decyduje lekarz	Przychodnie POZ
Dzieci 6 miesięcy-4 lata szczepione przeciw COVID-19 z ciężkim niedoborem odporności	Spikevax XFG w dawce pediatrycznej 25 mikrogramów	Kolejna dawka po 2 miesiącach. O szczepieniu decyduje lekarz	Przychodnie POZ

Szczepienie jest szczególnie zalecane:

- osobom o obniżonej odporności, u których COVID-19 może mieć ciężki przebieg, czyli:

    - osobom powyżej 60 lat
    - dzieciom, młodzieży i dorosłym z chorobami współistniejącymi, czyli otyłością (BMI ≥ 25), cukrzycą, przewlekłą chorobą płuc, przewlekłą chorobą nerek, chorobą układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami neurorozwojowymi, aktywną chorobą nowotworową, chorobą immunosupresyjną lub leczeniem immunosupresyjnym

- pensjonariuszom placówek opieki długoterminowej i ich opiekunom
- kobietom w ciąży (w celu zmniejszenia liczby powikłań COVID-19 u noworodków)
- pracownikom ochrony zdrowia, zwłaszcza mającym bezpośredni kontakt z pacjentami i materiałem zakaźnym.

Czy możesz łączyć szczepienia

Szczepionkę przeciw COVID-19 można podawać w czasie jednej wizyty z innymi szczepionkami, w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu innych szczepionek. W tym „żywych”, inaktywowanych, a także szczepionek zalecanych kobietom w ciąży.

Zalecane jest łączenie szczepienia przeciw COVID-19 ze szczepieniem przeciw grypie.